


♀ Frauen

Behandlung mit Tenofoviridisoproxil

Abschätzung der Kreatinin-Clearance aus der Serum-Kreatinin-Konzentration

1 Gewicht in kg



4 Kreatinin-Clearance in ml / min

Beispiel: 60 kg schwere Frau, 40 Jahre alt, Serumkreatinin 2,0 mg / dl

Vorgehen: Stelle unter 1 Gewicht 60 kg das 2 Alter 40 Jahre; ohne weitere Verschiebung kann nun unter 3 Serumkreatinin bei 2,0 mg / dl die 4 Kreatinin-Clearance von 36 ml / min abgelesen werden.

Berechnete Werte, Formel von Cockcroft-Gault

* Quelle: Modifiziert nach Parmar MS:
Chronic renal disease. BMJ 2002; 325:85-90




♂ Männer

Behandlung mit Tenofoviridisoproxil

Abschätzung der Kreatinin-Clearance aus der Serum-Kreatinin-Konzentration

1 Gewicht in kg



4 Kreatinin-Clearance in ml / min

Beispiel: 60 kg schwerer Mann, 40 Jahre alt, Serumkreatinin 2,0 mg / dl

Vorgehen: Stelle unter 1 Gewicht 60 kg das 2 Alter 40 Jahre; ohne weitere Verschiebung kann nun unter 3 Serumkreatinin bei 2,0 mg / dl die 4 Kreatinin-Clearance von 42 ml / min abgelesen werden.

Berechnete Werte, Formel von Cockcroft-Gault

* Quelle: Modifiziert nach Parmar MS:
Chronic renal disease. BMJ 2002; 325:85-90



+

-


+

-



2 Alter in Jahren

3 Serumkreatinin in $\mu\text{mol/l}$
mg / dl



-

±

-

-


±

-



2 Alter in Jahren

3 Serumkreatinin in $\mu\text{mol/l}$
mg / dl



+

+

+

+