



Rivastigmin transdermale Pflaster

**Hinweise zur Anwendung
und Patiententagebuch**

Rivastigmin transdermale Pflaster

Hinweise zur Anwendung und Patiententagebuch

Dieses Patiententagebuch zur Anwendung von Rivastigmin Heumann transdermalen Pflastern wurde als Teil der Zulassung erstellt. Im Rahmen des Risikomanagement-Plans wurden über die Routinemaßnahmen hinaus, zusätzliche risikominimierende Maßnahmen mit der Zulassung des Arzneimittels beauftragt, um das Risiko des Auftretens von Überdosierungen aufgrund inkorrektter Anwendung von Rivastigmin transdermalen Pflastern zu reduzieren und das Nutzen-Risiko-Verhältnis von Rivastigmin transdermalen Pflastern zu verbessern.

Dieses Patiententagebuch ist damit verpflichtender Teil der Zulassung, um sicherzustellen, dass Angehörige der Heilberufe, die Rivastigmin transdermale Pflaster verschreiben und zur Anwendung bringen, sowie Patienten die besonderen Sicherheitsanforderungen kennen und berücksichtigen.

Hinweise zur Anwendung

1. Bitte beachten

- Nehmen Sie das Pflaster vom Vortag ab, bevor Sie EIN neues Pflaster aufkleben.
- Nur ein Pflaster pro Tag anwenden.
- Schneiden Sie das Pflaster nicht in Stücke.
- Drücken Sie das Pflaster mit der Handfläche mindestens 30 Sekunden fest.

2. Wie Sie das Pflaster anwenden


Entfernen Sie sorgfältig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues verwenden.



Jedes Pflaster ist einzeln in einem versiegelten Schutzbeutel verpackt. Öffnen Sie den Beutel erst, wenn Sie gleich danach das Pflaster aufkleben wollen. Schneiden Sie den Beutel an der gestrichelten Linie mit einer Schere auf und entnehmen Sie das Pflaster aus dem Beutel.



Die selbstklebende Seite des Pflasters ist mit einer Schutzfolie überzogen. Ziehen Sie eine Hälfte der Schutzfolie **langsam von oben nach unten** ab und achten Sie darauf, die Klebeflächen nicht mit den Fingern zu berühren.



Legen Sie das Pflaster mit der selbstklebenden Seite auf den oberen oder unteren Rückenbereich, den Oberarm oder den Brustkorb und ziehen Sie dann die zweite Hälfte der Schutzfolie ab.



Drücken Sie dann das Pflaster mit der Handfläche mindestens 30 Sekunden fest, so dass alle Kanten ordentlich haften.



Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen benötigen, lesen Sie bitte die Packungsbeilage, die dem Arzneimittel beiliegt.
Fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht sicher sind.

3. Wo Sie das Pflaster aufkleben

- Entfernen Sie sorgfältig das vorhandene Pflaster, bevor Sie ein neues verwenden.
- Kleben Sie täglich EIN Pflaster auf NUR EINEN der in der folgenden Abbildung gezeigten möglichen Bereiche:
- Sie können den gleichen Anwendungsbereich für das neue Pflaster verwenden (1 oder 2 oder 3 oder 4 oder 5 oder 6 oder 7 oder 8), jedoch nicht exakt dieselbe Körperstelle innerhalb des gleichen Bereiches.

